

## SPECIE CACCIABILI UCCELLI

### **Fischione** (*Anas penelope*)

Dimensioni medio-grandi, becco piccolo e stretto, coda breve e rotonda. Il maschio si distingue per la testa color castano con fronte fulvo-giallastra, dorso e fianchi grigio-vermicolati, petto rosato, specchio alare verde e nero, sottocoda nero bordato di bianco, becco blu-lavagna; la femmina è uniformemente brunastro-rossiccia striata con ventre bianco. In volo si distinguono le zone bianche verso la parte anteriore delle ali il ventre bianco ed il sottocoda nero

Lunghezza totale cm 45-48, ala cm 24-27, becco cm 3,2-3,6, coda cm 9,4-10,8, tarso cm 3,4-4, peso gr 500-700.

La voce nel maschio è un fischio acuto

Predilige specchi d'acqua costieri

(estuari, lagune aperte, acque costiere salmastre),  
ma anche interni (laghi, stagni, paludi, fiumi).



**Fischione** (*Anas penelope*)



**Canapiglia** (*Anas strepera*)

### **Canapiglia** (*Anas strepera*)

Dimensioni medio-grandi, forme simili al Germano reale, becco più breve della testa, coda rotonda. Entrambi i sessi hanno una macchia bianca sul margine posteriore dell'ala. Il maschio ha un piumaggio grigio-vermicolato sui fianchi e screziato sul capo e sul collo, petto bianco e sottocoda nero, becco color piombo con margini arancio; la femmina è brunastro macchiata di fulvo con becco scuro e margini arancioni.

La voce del maschio è una nota bassa unica

Lunghezza totale cm 50, ala cm 24-27, becco cm 3,6-4,6, coda cm 7,6-9,4, tarso cm 3,4-4, Peso gr 700-850.

Predilige specchi d'acqua interni e costieri, preferibilmente di acqua dolce; poco frequente in mare.

## SPECIE CACCIABILI UCCELLI




**Alzavola** (*Anas crecca*)

### **Alzavola** (*Anas crecca*)

È la più piccola delle anatre europee. Dimensioni medie, becco più corto della testa di color grigio-nerastro, coda leggermente rotonda. La testa castano scuro con una fascia verde curva dall'occhio all'indietro, e macchie color camoscio chiaro, specchio alare verde e nero, lunga striscia bianca sulle scapolari e due macchie giallastre ai lati del sottocoda. La femmina ha tinte brunastre macchiate di scuro e specchio alare verde ben marcato. Lunghezza totale cm 35, ala cm 17-19, becco cm 3,4-3,8, coda cm 6,2-7,2, tarso cm 2,6-3, peso gr 250-450.

La voce è un breve krrit nel maschio, e un aspro ed acuto queck queck nella femmina.

Predilige specchi d'acqua interni e costieri.



**Germano reale** (*Anas platyrhynchos*)

### **Germano reale** (*Anas platyrhynchos*)

Di grandi dimensioni, becco lungo quanto la testa, largo e appiattito, ali lunghe, coda breve e arrotondata. Il maschio ha il capo e il collo di color verde-scuro, collarino bianco, petto bruno-porporino, parti inferiori grigio-chiare, coda bianca con penne nere centrali ed arricciate; la femmina è di colore brunastro-fulvo con striature e macchie nerastre.

Lunghezza totale cm 57, ala cm 25-28, becco cm 4,8-5,8, coda cm 7,5-9,6, tarso cm 3,6-4,6, peso gr 700-1000.

La voce nel maschio è un calmo yeeb e nella femmina un molto sonoro qua qua. Predilige zone umide, paludi, fiumi, lagune salmastre, estuari e mare aperto.

## SPECIE CACCIABILI UCCELLI



**Codone** (*Anas acuta*)

### **Codone** (*Anas acuta*)

Dimensioni grandi, snella e con collo lungo, becco stretto più lungo della testa, coda nel maschio caratterizzata dalla lunghezza delle timoniere centrali. Il maschio ha il capo e il collo color bruno-cioccolato, petto bianco, fianchi e parti superiori grigio- vermicolati, specchio alare verde bordato di fulvo, coda lunga appuntita e filiforme, sottocoda nero, becco bluastr-grigio con apice nero; la femmina è brunastra macchiata di fulvo e bruno, specchio alare scuro, coda appuntita e becco grigio-bluastr.

Lunghezza totale cm 55-60, ala cm 24-28, becco cm 4,5-5,9, coda cm 17-20, tarso cm 3,8-4,4, peso: maschio gr 700-1300, femmina gr 600-900.

La voce del maschio è un fischio basso, della femmina un quak basso.

Predilige specchi d'acqua interni e costieri, estuari, coste del mare.



**Marzaiola** (*Anas querquedula*)

### **Marzaiola** (*Anas querquedula*)

Dimensioni medie di poco più grandi dell'Alzavola, becco un po' più lungo della testa di colore grigio-piombo. Il maschio presenta una banda bianca che dall'occhio si estende alla nuca, petto bruno con screziature, fianchi grigio-vermicolati, ventre bianco, specchio alare verde, si riconosce in volo per la parte anteriore delle ali grigio -blu pallido; la femmina è brunastra macchiata di fulvo e bruno, con sopracciglia e guance biancastre e specchio alare verde e grigio poco distinto.

Lunghezza totale cm 37-38, ala cm 17,4-19,8, becco cm 3,4-4, coda cm 6,2-7, tarso cm 2,6-3, peso gr 250-430.

La voce nel maschio è un krrrt, nella femmina un knèck.

Predilige specchi d'acqua interni e costieri, con preferenza per le acque dolci e basse.

## SPECIE CACCIABILI UCCELLI



**Mestolone** (*Anas clypeata*)

### **Mestolone** (*Anas clypeata*)

Dimensioni medio-grandisi, si distingue dalle altre anatre per il becco grosso e a "spatola", coda breve e rotonda. Il maschio ha il capo color verde con riflessi metallici, petto bianco, ventre e fianchi castani, dorso bruno-scuro, specchio alare verde bordato di bianco, becco nero; la femmina è brunastro macchiata con becco bruno.

Lunghezza totale cm 50, ala cm 21,6-25, becco cm 5,8-6,9, coda cm 7,2-8,5, tarso cm 3,2-3,8, peso: maschio gr 460-860, femmina gr 460-680.

La voce nel maschio è un profondo tak-tak, nella femmina un basso quak.

Predilige specchi d'acqua interni e costieri con bassi fondali e solo occasionalmente in mare e acque salate e profonde.



**Moriglione** (*Aythya ferina*)

### **Moriglione** (*Aythya ferina*)

Dimensioni medio-grandi, becco nero con una striscia azzurra-pallido lungo circa quanto la testa, ali non lunghe, coda breve rotonda. Il maschio ha testa e collo di colore castano-rossiccio uniforme, dorso e fianchi grigiastro-vermicolati, petto e sottocoda neri; la femmina è brunastro-scura con guance e gola più chiare. Ambedue i sessi hanno la banda alare grigiastra. Lunghezza totale cm 45, ala cm 20-22, becco cm 5, coda cm 4,6-5,6, tarso cm 3,5-3,8, peso gr 750-1300.

La voce del maschio è un fischio rauco, della femmina un borbottio rauco. Predilige specchi d'acqua aperti con fondali di media profondità, eccezionalmente in mare.

## SPECIE CACCIABILI UCCELLI



**Coturnice** (*Alectoris graeca*)

### **Coturnice** (*Alectoris graeca*)

Dimensioni medie, corporatura massiccia, becco tozzo, tarso provvisto di una sorta di sperone generalmente assente nella femmina, coda ed ali corte e arrotondate. Piumaggio di colore grigiastro nelle parti superiori e bruno-grigiastro in quelle inferiori, fianchi pesantemente barrati di nero e di bianco, regione golare biancastra circondata da un collare nero, becco e zampe rosse.

Lunghezza totale cm 35, ala cm 15-17,5, becco cm 1,4-1,6, coda cm 8-9, tarso cm 4,3-4,7, peso gr 350-650.

La voce del maschio è molto varia e va da un uit-uit, a k-k-kwowk, a un tcertsi-ritt-ci.

Predilige terreni elevati, pietrosi e rocciosi, zone aride e sassose alternate a boschi e ad aree cespugliate delle Alpi e dell'Appennino.



**Pernice rossa** (*Alectoris rufa*)

### **Pernice rossa** (*Alectoris rufa*)

Dimensioni medie, corporatura massiccia, zampe e becco rossi, collareto nero che contorna la gola bianca, vertice castano con una lunga striscia bianca sopra l'occhio, becco tozzo, coda ed ali corte ed arrotondate, tarso provvisto di una sorta di sperone nel maschio. Parti superiori di colore bruno-olivastro, , fianchi grigi barrati di bianco, nero e castano.

Lunghezza totale cm 33-34, ala cm 15-16, becco cm 1,5-1,8, coda cm 8,8-9,6, tarso cm 4-4,4, peso gr 390-400.

La voce del maschio è un ciak ciak-er o un lento sciak-sciak, o un cac-cac.

Predilige aree aperte e cespugliate, soleggiate e a clima secco, anche in zone di montagna non molto elevate. E' in genere una specie relativamente adattabile a diversi ambienti.

## SPECIE CACCIABILI UCCELLI



**Starna** (*Perdix perdix*)

### **Starna** (*Perdix perdix*)

Dimensioni medie, corporatura massiccia, becco tozzo, coda ed ali corte e arrotondate. Piumaggio delle parti superiori di colore marrone striato di fulvo, fianchi barrati di castano, testa e gola castano-arancio, petto grigio vermicolato, macchia marrone a ferro di cavallo sul basso petto nel maschio molto più sviluppata, coda rossiccia. Il maschio si distingue dalla femmina per il fatto che quest'ultima ha le copritrici mediane delle ali striate trasversalmente.

Lunghezza totale cm 30, ala cm 15-16, becco cm 1,3-1,6, coda cm 7,2-8,3, tarso cm 3,8-4,1, peso gr 380-400.

La voce è un grattante krrr-ic, o kar-uic

Predilige aree steppose e prative parzialmente boschive, anche in zone montane non troppo elevate, terreni coltivati alternati ad incolti.



**Quaglia** (*Coturnix coturnix*)

### **Quaglia** (*Coturnix coturnix*)

Dimensioni piccole, corpo raccolto, becco breve, coda corta. Colore dominante fulvo-giallastro fortemente striato di bianco, fulvo e nero con strie chiare e scure sui fianchi, il maschio ha la gola con striature nerastre. La femmina si caratterizza per la gola bianco-fulviccia e il petto finemente macchiato di scuro. Relativamente frequenti sono gli individui melanici e isabellini.

Lunghezza totale cm 17-18, ala cm 10-11, becco cm 11-12, tarso cm 23-28, peso gr 80-100.

La voce è un ripetuto quit-quit-quit nel maschio, mentre nella femmina quip-quip.

Predilige pianure e altipiani aperti con bassa vegetazione (praterie erbose, campi coltivati a grano, foraggere, ecc.).

## SPECIE CACCIABILI UCCELLI

### Fagiano (*Phasianus colchicus*)

Di grandi dimensioni, becco robusto, ali brevi e rotonde, coda lunga appuntita, tarso munito di sperone nel maschio. I colori del piumaggio presentano diversità nelle varie razze più o meno ibridate, che sono state liberate nel nostro Paese. I maschi hanno colori vivaci con testa verde scuro, a volte collarino bianco, piumaggio che va dal rosso-arancio al verde-scuro, caruncole scarlatte intorno agli occhi e corti ciuffi auricolari; le femmine presentano un piumaggio poco appariscente.

Lunghezza totale cm 75-78, ala cm 23-26, becco cm 2,8-3,2, coda cm 42-52, tarso cm 6-7,8, peso: maschio gr 1200-1800, femmina gr 1000-1200.

La voce del maschio è uno stridente kok-kok.

Predilige condizioni di vita negli ambienti più vari, manifestando una spiccata adattabilità.



Fagiano (*Phasianus colchicus*)



Fagiano (*Phasianus colchicus*) femmina

## SPECIE CACCIABILI UCCELLI



**Porciglione** (*Rallus aquaticus*)

### **Porciglione** (*Rallus aquaticus*)

Descrizione: dimensioni medio-piccole, becco lungo, compresso, assottigliato e leggermente curvato all'apice, coda rotonda, arcuata e stretta. Colore delle parti superiori bruno-olivastro con fitte striature nere, lati del capo, collo e petto grigio-ardesia, fianchi barrati di bianco e nero, sottocoda biancastro, becco rosso.

Voce: un acuto chic-chic-chic.

Riproduzione: aprile- luglio, uova sei-dieci di colore bianco crema.

Alimentazione: insetti vari vegetazione acquatica.

Habitat: rive di specchi d'acqua, fossi, fiumi, paludi, ecc., rivestite di folte canneti e giuncheti.

Stanziale.

Presenza sul territorio: comune, canneti, vegetazione ripariale del lago di Occhito, del fiume Fortore, altri laghetti del comprensorio.



**Gallinella d'acqua** (*Gallinula chloropus*)

### **Gallinella d'acqua** (*Gallinula chloropus*)


Dimensioni medie, becco appuntito con alla base uno scudo che si prolunga in una placca frontale rosso brillante, ali e coda brevi e rotonde, zampe verdi, piedi con dita lunghe, munite di unghie robuste. Colore del piumaggio bruno-verdastro, con striature bianche sui fianchi, sottocoda pure bianco, solcato nel mezzo da una linea nera.

Lunghezza totale cm 32-33, ala cm 17-19, becco cm 2,4-2,9, coda cm 6,5-8, Tarso cm 4,9-5,3, peso gr 210-280.

La voce è un aspro krrr-ik o kittik.

Predilige folta vegetazione sulle rive di stagni, paludi, laghi, fiumi, canali, ecc., e praterie adiacenti più o meno umide.

## SPECIE CACCIABILI UCCELLI



**Folaga** (*Fulica atra*)

### **Folaga** (*Fulica atra*)

Descrizione: di medie dimensioni, becco compresso e appuntito con alla base uno scudo carnoso che assume l'aspetto di una placca frontale, coda breve e rotonda, piedi flessolobati (cioè con dita provviste di membrane laterali che si restringono in corrispondenza delle giunture). Colore completamente nero lavagna che contrasta con il bianco del becco e della placca frontale.

Voce: acuti cuoc-chiuc, cou-cou-cou

Riproduzione: metà marzo in poi, sette-otto uova color pietra con macchie scure.

Alimentazione: vegetazione acquatica, semi, insetti.

Habitat: paludi, stagni, laghi, lagune salmastre, estuari.

Stanziale: - Presenza sul territorio: comune, lago di Occhito, fiume Fortore, laghetti vari del comprensorio.



**Pavoncella** (*Vanellus vanellus*)

### **Pavoncella** (*Vanellus vanellus*)

Dimensioni medie, forme eleganti, ali larghe e rotonde, coda quasi quadrata, becco piuttosto breve e diritto, ciuffetto di penne sulla nuca. Piumaggio di colore nero-verde iridescente nelle parti superiori, bianco in quelle inferiori, larga banda pettorale nera, sottocoda castano vivo.

Lunghezza totale cm 30, ala cm 21,6-23,4, becco cm 2,3-2,7, coda cm 9-10, tarso cm 4,4-4,9, peso gr 200-220.

La voce è un forte e nasale kii-ui o kii-rr-ui

Predilige campagne coltivate umide, marcite, margini di lagune e paludi, rive dei fiumi, estuari, ecc.

## SPECIE CACCIABILI UCCELLI



**Combattente** (*Philomachus pugnax*)



**Frullino** (*Lymnocyptes minimus*)

### **Combattente** (*Philomachus pugnax*)

Dimensioni medie, becco breve e sottile, leggermente ricurvo e appuntito, coda rotonda. Colorazione brunastro-sabbia macchiata di scuro con le parti inferiori biancastre e petto fulvo-chiaro, zampe giallastre e becco brunonerastro; la femmina è di minori dimensioni ma di colore del piumaggio simile a quello del maschio. Quest'ultimo, durante la stagione degli amori, si orna di un grande collare di penne a tinte variabile con combinazioni di nero, castano, bianco, bruno e crema.

Lunghezza totale cm 29, ala: maschio cm 18,6-19,8, femmina cm 14,9-16,4, becco: maschio cm 3,4-3,8, femmina cm 2,9-3,3, coda cm 6,1-6,8, tarso cm 4,5-5,2, peso: maschio gr 200, femmina gr 130.

La voce è un profondo suono gutturale.

Predilige paludi, prati umidi, risaie, rive fangose di stagni, laghi e specchi d'acqua in genere.

### **Frullino** (*Lymnocyptes minimus*)

Dimensioni più piccole del beccaccino, becco relativamente breve, coda cuneata. Colore del piumaggio brunastro con riflessi verdastri e purpurei nelle parti superiori e leggermente barrato in quelle inferiori, zampe verdastre e becco carnacino con apice scuro. Sessi simili.

Lunghezza totale cm 19, ala cm 10,7-11,6, becco cm 3,9-4,1, coda cm 4,6-5, tarso cm 2,3-2,5, peso gr 55-90.

La voce è un curioso tambureggiamento attutito.

Predilige paludi, risaie, marcite, stagni, prati allagati, rive paludose di laghi e fiumi.

## SPECIE CACCIABILI UCCELLI



**Beccaccino** (*Capella gallinago*)

### **Beccaccino** (*Capella gallinago*)

Dimensioni medie, becco assai lungo diritto e sottile, occhi grandi, ali lunghe e puntute, coda a ventaglio con poco bianco ai lati. Piumaggio di color bruno-fulvo barrato e striato di nero, marrone e fulvo, capo nerastro solcato da una stria chiara. Sessi simili.

Lunghezza totale cm 26-27, ala cm 12,8-14, becco cm 6-7, coda cm 5,3-6,1, tarso cm 2,9-3,3, peso gr 100-160.

La voce è un ripetuto cic-ka.

Predilige paludi, risaie, marcite, prati allagati, rive paludose di laghi e di fiumi.



**Beccaccia** (*Scolopax rusticola*)

### **Beccaccia** (*Scolopax rusticola*)

Dimensioni medie, corpo tendenzialmente tozzo, becco lungo, diritto e sottile, occhi grandi, ali, coda e tarsi relativamente brevi. Colore bruno-rossastro con notevoli variazioni individuali, becco carnacino con apice bruno-scuro. Sessi simili.

Lunghezza totale cm 34-36, ala cm 18,5-20,5, becco cm 6,5-7,5, coda cm 7-8, tarso cm 3,4-3,8, peso gr 200-400.

La voce è un soffice , gracidante orrrt-orrrt, e un acuto tsiuck.

Predilige boschi umidi con sottobosco e radure sia di monte sia di piano.

## SPECIE CACCIABILI UCCELLI



**Colombaccio** (*Columba palumbus*)

### **Colombaccio** (*Columba palumbus*)

Dimensioni medie, forme pesanti e massicce, becco appuntito ricurvo all'apice e con base carnosa (cera), tarsi brevi, ali e coda piuttosto lunghe. Colore grigio-bluastro con parti inferiori sfumate di rosso-vinato e collo ornato da piume a riflessi verdi e purpurei. Per la larga banda bianca attraverso le ali e le macchie bianche sul lato del collo degli adulti è facilmente riconoscibile in volo dagli altri Columbiformi. Sessi simili.

Lunghezza totale cm 40, ala cm 23,5-25,5, becco cm 2,1-2,5, coda cm 14-15, tarso cm 3-3,5, peso gr 440-580.

La voce è un profondo e sommesso tubare; una frase ripetuta di cinque note cu-cu-ruu, cu-cuu.

Predilige boschi di quercia, leccio, faggio, foreste con radure e zone coltivate, pinete e macchia litoranea. Frequenta anche i parchi nelle città.



**Tortora** (*Streptopelia turtur*)

### **Tortora** (*Streptopelia turtur*)

Dimensioni medio-piccole, forme slanciate, becco relativamente breve con la base ricoperta di pelle (cera), tarsi relativamente corti, ali più brevi e coda più lunga del Colombo. Colore bruno-grigiastro con petto rosso-vinato, copritrici alari fulve macchiate di nero, lati del collo barrati di bianco e nero, becco nerastro con apice giallastro e base biancastra. Sessi simili.

Lunghezza totale cm 27, ala cm 16-18, becco cm 1,6-1,9, coda cm 9,5-11, tarso cm 2,3-2,5, peso gr 145-160.

La voce è un ripetuto turr-turr vibrante.

Predilige pianure e colline alberate, boschi intramezzati da aree coltivate, altopiani aperti con vegetazione arborea sparsa.

## SPECIE CACCIABILI UCCELLI



**Allodola** (*Alauda arvensis*)



**Cesena** (*Turdus pilaris*)

### **Allodola** (*Alauda arvensis*)

Dimensioni piccole, becco robusto, coda relativamente lunga e un poco forcuta, ciuffo di penne sulla nuca più lunghe delle altre. Colore del piumaggio molto mimetico con l'ambiente in cui vive: Parti superiori grigio-brunastre fittamente striate di nero e parti inferiori fulvo-biancastre, timoniere esterne bianche. Sessi simili.

Voce: un melodioso trik-i.

Riproduzione: nidifica a terra, tre o quattro uova di colore grigio-verdastre-crema punteggiate.

Alimentazione: in autunno, chicchi di grano, semi e germogli di piante di campo, in primavera ed estate insetti vari.

Habitat: zone aperte coltivate, erbose e cespugliate sia di pianura che di altopiano, marcite, steppe, brughiere, zone dunose e paludose.

Migratore.

Presenza sul territorio: comune, campi coltivati, prati-pasco

### **Cesena** (*Turdus pilaris*)

Dimensioni medio-piccole, forme piuttosto allungate, becco robusto, tarsi lunghi. Colorazione del dorso bruno-castano, coda castana, coda e petto fulvo-rugginoso striato di scuro, testa grigio-blu, ascellari bianche, becco giallastro con apice nero; la femmina ha tinte meno forti e contrastanti.

Lunghezza totale cm 25, ala cm 13-15, becco cm 2,3-2,4, coda cm 10-11, tarso cm 3,1-3,4, peso gr 90-100.

La voce è un aspro chiacchierante tciack-tciack-tciack ed un calmo sii.

Predilige boschi, parchi e giardini in prossimità di praterie e pianure coltivate, frutteti.

## SPECIE CACCIABILI UCCELLI

### **Merlo** (*Turdus merula*)

Dimensioni medio-piccole, becco robusto, tarsi lunghi. Il maschio ha un colore uniformemente nero con becco giallo, la femmina è bruno-nerastra con mento e gola grigiastri.

Lunghezza totale cm 25, ala cm 11,5-13,5, becco cm 2,3-2,7, coda cm 9,5-11, tarso cm 3,2-3,4, peso gr 80-100.

La voce è uno stridente chiacchierio, quando viene fatto levare; una note persistente tcink-tcink-tcink, un ansioso tciuck, un sottile tsii.

Predilige boschi con sottoboschi e radure, campagne alberate e cespugliate, parchi e giardini delle città.



**Merlo** (*Turdus merula*)



**Merlo** (*Turdus merula*) femmina

## SPECIE CACCIABILI UCCELLI

### **Tordo bottaccio** (*Turdus philomelos*)

Dimensioni medio-piccole, forme piuttosto slanciate, becco robusto, tarsi lunghi. Piumaggio di colore brunastro-oliva nelle parti superiori e bianco-fulvo fittamente macchiato di scuro nelle parti inferiori, copritrici inferiori delle ali bianco-fulve, coda bruno-rossastra.

Lunghezza totale cm 22, ala cm 11-12, becco cm 2-2,3, coda cm 7,6-9, tarso cm 3-3,5, peso gr 63-72.

La voce è un forte tciack o tcick ripetuto rapidamente quando è allarmato, richiamo in volo un soffice sip.

Predilige boschi e foreste ricchi di sottobosco, giardini e parchi, pianure alberate, vigneti, oliveti, macchia mediterranea.



**Tordo bottaccio** (*Turdus philomelos*)

### **Tordo sassello** (*Turdus iliacus*)

Dimensioni medio-piccole, forme piuttosto slanciate, becco robusto, tarsi lunghi. il Tordo sassello è il più piccolo rappresentante della famiglia dei tordi. Piumaggio parti superiori bruno scuro, ventre e petto bianchi striati di scuro. È molto simile al Tordo bottaccio: se ne distingue, tuttavia, per i colori sgargianti, e in particolare per l'accesa tonalità rosso ruggine dei fianchi e del sottoala. Lunghezza totale cm 22, ala cm 11-12, becco cm 2-2,3, coda cm 7,6-9, tarso cm 3-3,5, peso gr 63-72.

Predilige boschi e foreste ricchi di sottobosco, giardini e parchi, pianure alberate, vigneti, oliveti, macchia mediterranea



**Tordo sassello** (*Turdus iliacus*)

## SPECIE CACCIABILI UCCELLI

### **Ghiandaia** (*Garrulus glandarius*)

E' lunga oltre 30 cm, dal piumaggio di colore bruno sfumato di rosa, a eccezione della coda che è nera, del groppone e delle ali che sono parzialmente bianchi, della cresta a strisce bianche e nere, della macchia azzurra, barrata di nero, delle copritrici alari.

La voce è un penetrante rauco skreek.

Frequenta, in piccoli gruppi, i boschi.



**Ghiandaia** (*Garrulus glandarius*)

### **Gazza** (*Pica pica*)

E' lunga sino a 45 cm, inconfondibile per il piumaggio in cui il bianco del ventre, dei fianchi e degli scapolari contrasta con il nero del resto del corpo. La gazza vive sola o in piccoli gruppi, costituendo associazioni più numerose durante la stagione fredda.

La voce è un forte rapido ciak-ciak-ciakiciak.

Frequenta di preferenza i terreni aperti con qualche albero, specialmente dove vi sia abbondanza d'acqua.



**Gazza** (*Pica pica*)

## SPECIE CACCIABILI UCCELLI



**Cornacchia grigia** (*Corvus cornix*)

### **Cornacchia grigia** (*Corvus cornix*)

Dimensioni medio-grandi, becco grosso, robusto e ricurvo, coda mediamente arrotondata. Colore del dorso e del ventre grigio, colore del piumaggio nero. Lunghezza totale cm 46, ala cm 31-34,5, becco cm 3,3-4,1, coda cm 17,4-19,5, tarso cm 5,4-6,4, peso gr 450-580. Coltivazioni, praterie alberate, montagne.

## SPECIE CACCIABILI MAMMIFERI



**Lepre europea** (*Lepus europaeus*)

### **Lepre europea** (*Lepus europaeus*)

Corpo slanciato, testa piuttosto piccola, occhi grandi, orecchie lunghe, coda relativamente sviluppata, arti posteriori notevolmente più lunghi degli anteriori. Colore dominante fulvo-grigiastro con tinte nerastre nel dorso; ventre, parti interne degli arti e parte inferiore della coda biancastre. Non esiste dimorfismo sessuale.

Lunghezza testa-corpo cm 48-70, orecchio cm 8,5-14, piede posteriore cm 11-16, coda cm 7,4-11, peso kg 2,5-6,5, denti 28, mammelle 6.

Presente pressochè dovunque, preferisce terreni pianeggianti e collinari steppici, ma si è ben adattata a zone agricole anche intensamente coltivate. In montagna si spinge fino ad altitudini di m 2000.



**Volpe** (*Vulpes vulpes*)

### **Volpe** (*Vulpes vulpes*)

Forme snelle, muso lungo e appuntito, orecchie grandi, arti relativamente brevi, coda lunga e folta. Colore dominante delle parti superiori del corpo bruno-fulvo tendente al rossastro, parti inferiori biancastre o scuro ardesia. Notevoli sono comunque le variazioni di colore stagionali e individuali.

Lunghezza testa-corpo cm 57-77, orecchio cm 6-11, piede posteriore cm 12-16, coda cm 30-48, altezza alla spalla cm 35-40, peso kg 6-10, denti 42, mammelle 6.

Ubiquitaria, si insedia in quegli ambienti selvaggi che offrono possibilità di rifugio. Si spinge anche a notevoli altitudini.

## SPECIE CACCIABILI MAMMIFERI



**Cinghiale** (*Sus scrofa*)

### **Cinghiale** (*Sus scrofa*)

Forme massicce, testa grande, occhi piccoli, orecchie grandi e diritte con all'apice un pennello di setole. Arti relativamente brevi, quelli posteriori più corti degli anteriori. Dita provviste ciascuna di uno zoccolo. Coda corta terminante con un ciuffo di setole. Dentatura caratterizzata dallo sviluppo dei canini (zanne) che sporgono visibilmente, specie nel maschio adulto. Colore dominante bruno-nerastro e brizzolato sulle guance e sulla gola. I giovani sono di colore bruno-chiaro con strisce longitudinali bruno-scure o nerastre.

Lunghezza testa-corpo cm 100-150, coda cm 12-20, altezza al garrese cm 60-90, peso: maschio kg 45-180, femmina kg 30-150, denti 44, mammelle 12. Boschi ricchi di sottobosco e macchia mediterranea, preferibilmente presso stagni, paludi, corsi d'acqua e campi coltivati. Si spinge in montagna fino al limite della vegetazione arborea.



**Cervo** (*Cervus elaphus*)

### **Cervo** (*Cervus elaphus*)

Corpo raccolto e robusto, arti slanciati, dita mediane con zoccoli stretti e allungati, coda piuttosto lunga. Maschi con corna caduche molto grandi e ramificate, che vengono annualmente rinnovate da marzo a giugno. La ramificazione delle corna lo fanno facilmente distinguere a prima vista dal maschio del daino, che le ha, invece, a pala. Mantello di color bruno-rossastro in estate e più grigio-bruno in inverno, nei giovani maculato di bianco.

Lunghezza testa-corpo cm 160-250, coda cm 12-15, altezza al garrese cm 100-150, lunghezza delle corna cm 80-100, peso kg 100-250, denti 34, mammelle 4.

Boschi di latifoglie, conifere e misti inframmezzati da aree aperte.

Nelle foreste montane si spinge fino al limite superiore della vegetazione arborea.

## SPECIE CACCIABILI MAMMIFERI

### **Daino** (*Dama dama*)

Corpo raccolto, occhi e orecchie grandi, arti sottili con dita mediane rivestite di zoccoli, coda piuttosto lunga. Maschi con corna che vengono annualmente rinnovate: cadono in maggio e ricrescono in luglio-agosto. Le tipiche corna a pala lo fanno facilmente distinguere a prima vista dal maschio del cervo, che le ha ramificate. Mantello estivo di color fulvo-rossiccio con macchie bianche nelle parti superiori e nei fianchi, parti inferiori biancastre; di inverno più grigio con macchie meno distinte.

Lunghezza testa-corpo cm 130-155, coda cm 16-19, altezza al garrese cm 80-100, lunghezza delle corna cm 75-90, peso: maschio kg 60-85, femmina kg 30-50, denti 32, mammelle 4.

Boschi preferibilmente di latifoglie, ma anche di conifere, ricchi di sottoboschi e radure, macchia mediterranea, incolti cespugliati.



**Daino** (*Dama dama*)

### **Capriolo** (*Capreolus capreolus*)

Forme slanciate, testa piccola, occhi e orecchie grandi, arti snelli ma forti, dita mediane terminanti con zoccoli, coda brevissima. Maschi con corna brevi e a tre punte negli adulti, le quali vengono annualmente rinnovate da novembre a marzo. Colore dominante del mantello rossastro in estate e grigiastro in inverno, con parti inferiori più chiare.

Lunghezza testa-corpo cm 90-135, orecchi cm 14-15, coda cm 2-3, altezza al garrese cm 66-75, lunghezza delle corna cm 15-23, peso kg 14-16, denti 32 (34), mammelle 4.

Boschi di latifoglie e misti con radure e incolti cespugliati, macchia mediterranea. Aree di distribuzione compreso tra il livello del mare e il limite superiore della vegetazione arborea.



**Capriolo** (*Capreolus capreolus*)

## SPECIE CACCIABILI MAMMIFERI



**Mouflone** (*Ovis Musimon*)

### **Mouflone** (*Ovis Musimon*)

Dimensioni medie, occhi grandi e orecchie relativamente brevi, arti sottili e robusti, dita mediane terminanti con piccoli zoccoli, coda breve. Maschi con corna perenni, robuste, non ramificate e ricurve con l'estremità rivolta in avanti. Colore dominante in estate bruno-rossastro nelle parti superiori e biancastro nelle inferiori, con una evidente macchia biancastra nella parte alta dei fianchi; in inverno il mantello è più scuro. Le femmine ed i giovani hanno colori più chiari tendenti al fulvo.

Lunghezza testa-corpo cm 100-130, orecchio cm 6,5-7.5, piede posteriore cm 21,5-24,5, altezza al garrese cm 65-75, peso kg 25-50, denti 32, mammelle 2. Boschi, boscaglie e cespugliati di montagne scoscese e rocciose, boschi appenninici d'alto fusto, macchia mediterranea.